

Familia Lutodrilidae

Lombrices de las orillas de los rios o de fangos.

Familia Lutodrilidae

Forma del cuerpo (en sección transversal):

- Cuadrangular.

Familia Lutodrilidae

Poros dorsales:

- Ausentes.

Familia Lutodrilidae

Clitelo:

- Anular.
- Ocupa entre 35 y 51 segmentos.
- Desde el segmentos (20) 25 hasta el 61 (71).

Familia Lutodrilidae

Tubérculos pubertarios:

- Presentes.
- Pareados.
- Se extienden por la mayor parte del clitelo.
- Aliformes.

Familia Lutodrilidae

Poros masculinos:

- Intracitelas.
- Pareados.
- En el segmento 32.

Poros femeninos:

- Pareados.
- En el segmento 24.

Familia Lutodrilidae

Poros de las espermatecas:

- Múltiples.
- Entre los intersegmentos 15/16 y 25/26.

Familia Lutodrilidae

Molleja:

- Ausentes.

Dilatación intestinal:

- Presente en los segmentos 21 al 24.

Familia Lutodrilidae

Glándulas calcíferas:

- Ausentes.

9 10 11 12 13

Familia Lutodrilidae

Próstatas:

- Ausentes.

Familia Lutodrilidae

Testículos:

- 10 pares.
- En los segmentos 12 al 21.

Ovarios:

- Un par en el segmento 23.

Familia Lutodrilidae

Espermatecas:

- Adiverticuladas.
- Múltiples.
- Interparietales.

Familia Lutodrilidae

Nefridios:

- De tipo **holonefridio (meganefridios)**.